

HƯỚNG DẪN

Phòng bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lùn lụi trên lúa và trừ cỏ, diệt ốc bươu vàng - vụ Mùa 2022

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp.

Thực hiện công văn số 933/UBND- DVNN ngày 24/6/2022 và công văn số 966/UBND- NN&PTNT ngày 06/7/2022 của UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giao HTX Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân và các bộ phận chuyên môn có liên quan tăng cường công tác hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tại thời điểm đầu vụ Mùa năm 2022 như sau:

1. Trừ rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen trên diện tích mạ được để diệt trừ môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và vàng lùn lụi

Thường xuyên kiểm tra những diện tích mạ được và phun trừ kịp thời rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen để loại trừ môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lụi.

Thời điểm phun trước khi nhổ cấy từ 4- 5 ngày.

Sử dụng một trong các loại thuốc như: Marshal 200SC, Oshin 20WP, Chess 50WG... Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì của nhà sản xuất, phun đảm bảo 1 bình 16 lít/sào mạ, nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát.

2. Tiến hành các biện pháp trừ cỏ trên ruộng canh tác

2.1. Biện pháp thủ công và canh tác

- Vệ sinh đồng ruộng, mương máng trước khi gieo cấy.
- Làm đất kỹ và trang ruộng bằng phẳng, thu gom, xử lý triệt để rác, cỏ dại trên mặt ruộng.
- Thường xuyên duy trì mực nước trong ruộng sau khi cấy 3- 5 cm.
- Đối với diện tích lúa gieo thẳng, sau khi hạt giống đã cắm rễ và cây mầm cao 1- 2 cm cần điều tiết mực nước trên mặt ruộng khoảng 0,5 – 1,0 cm để cây lúa phát triển tốt và hạn chế cỏ dại. Nếu mưa ngập phải bơm, tháo cạn kịp thời.

2.2. Biện pháp hóa học

+ Đối với lúa gieo thẳng:

Chỉ sử dụng nhóm thuốc cỏ tiền nảy mầm sớm có khả năng diệt cả cỏ một và hai lá mầm như: Sofit 300EC, Butafit 320EC, Chani 300EC, Vithafit 300EC...Nhóm thuốc này sử dụng tốt nhất ngay sau khi gieo sạ từ 0- 3 ngày. Sau khi xử lý thuốc trừ cỏ cần duy trì độ ẩm trong ruộng. Tuyệt đối không để nước đọng trên ruộng sẽ làm cho mống mạ bị chết và hiệu quả trừ cỏ không cao.

+ Đối với lúa cấy mạ sân:

- Nên sử dụng nhóm thuốc tiền nảy mầm dòng hoạt chất Butacholor như: Butafit 320EC, Heco 600EC, Taco 600EC...Nhóm thuốc này sử dụng sau khi cấy từ 3- 5 ngày, ruộng phải có từ 3- 5 cm nước và giữ nước trong ruộng từ 5- 7 ngày.

- Có thể sử dụng các loại thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm như: *Vitarai 18.5WP*, *Sofit Gold 271 WP*...Nhóm này có thể dùng để rắc hoặc phun sau cây từ 5- 21 ngày, cần duy trì mức nước trên ruộng từ 1- 2 cm trong thời gian từ 5- 7 ngày (Tuyệt đối không sử dụng các thuốc *Acenidax 17WP*, *Arorax 17WP*, *Aloha 25WP*...cho lúa cấy mạ sên do làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của lúa).

+ Đối với lúa cấy mạ được:

Ngoài sử dụng nhóm thuốc trừ cỏ như lúa cấy mạ sên còn có thể sử dụng một số thuốc trừ cỏ khác như: *Ferim 18.5WP*, *Acenidax 17WP*, *Arorax 17WP*, *Aloha 25WP*... Phun hoặc trộn với đất bột mịn để rắc sau cây từ 7- 10 ngày, khi rắc hoặc phun thì trên mặt ruộng phải có tối thiểu 2- 3 cm nước. Tuyệt đối không để nước ngập nồm cây lúa.

*Chú ý:

- Khi sử dụng thuốc trừ cỏ phải tùy thuộc vào đặc tính của thuốc mà điều chỉnh mực nước trên ruộng cho phù hợp để phát huy hết khả năng diệt cỏ của thuốc.
- Phải phun hoặc rắc đều trên ruộng, tốt nhất là phun thuốc.
- Không nên phun lại nhiều lần thuốc trừ cỏ trên cùng diện tích lúa cấy, trừ trường hợp những ruộng bị mưa ngập tràn bờ ngay sau khi phun thuốc.

3. Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời ốc bươu vàng (OBV)

Thường xuyên kiểm tra những diện tích lúa mới gieo cấy, đặc biệt lưu ý các diện tích gieo thẳng hoặc cấy mạ trên sên, những diện tích lúa thuộc khu triều trũng và gần kênh mương để phát hiện và xử lý kịp thời đối tượng OBV phá hại bằng các biện pháp sau:

+ Biện pháp thủ công

- Tạo các rãnh nhỏ xung quanh ruộng, khi tháo nước ốc tập trung ở rãnh rồi thu gom.
- Cắm cọc rải rác quanh ruộng để ốc dễ trũng lên, sau đó thu gom trứng ốc.
- Tại các vị trí dẫn nước vào ruộng nên đặt lưới để ngăn chặn ốc xâm nhập.

+ Biện pháp hóa học

- Chỉ sử dụng thuốc trừ OBV khi phát hiện thấy có ốc xuất hiện. Không phun thuốc tràn lan gây lãng phí vật tư và làm ô nhiễm môi trường.

- Sử dụng các loại thuốc trừ ốc như: *VTDax 700 WP*, *Padol 700 WP*, *Clodan supe 700 WP*... phun thuốc với nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất (Căn cứ vào mực nước trên ruộng để điều chỉnh nồng độ thuốc cho phù hợp, nâng cao hiệu quả diệt ốc), nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát.

4. Tập trung triển khai công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất

Đề nghị các địa phương triển khai thực hiện "Tuần lễ diệt chuột" trong giai đoạn đông lạnh, ở tất cả các khu đồng, khu dân cư, khu chuyển đổi, bãi rác...theo Hướng dẫn số 01/HD- TTDVNN ngày 10/01/2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Nhận được công văn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
 - Lãnh đạo Huyện Ủy
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - BCĐ SXNN huyện;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Như kính gửi;
 - Lưu TT;
- } Để báo cáo



Nguyễn Minh Thắng