

Số: 12/DV NN- BVTV

Về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh
cuối vụ trên lúa Chiêm xuân 2022

Tứ Kỳ, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Hội Nông dân các xã, thị trấn;
- Giám đốc HTX DV nông nghiệp.

Hiện nay, diện tích lúa Chiêm xuân trên địa bàn huyện trà sớm đang trong giai đoạn đòng đuôi đến chuẩn bị thu hoạch, trà muộn chủ yếu đang trong giai đoạn chín sữa đến chắc xanh.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, trên địa bàn huyện thời tiết vẫn duy trì hiện tượng nắng mưa xen kẽ, chiều tối và đêm có mưa to kèm giông. Nhiệt độ tăng dần, nhiệt độ trung bình ngày đêm 26°C - 33°C , ẩm độ 70 - 95%. Đây là điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy:

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã phát sinh và gây hại trên các giống nhiễm như: BC 15, TBR 225, Bắc Thơm số 7, Q5... hoặc trên các diện tích trà muộn chăm bón dư thừa đạm như tại các khu: đồng Thượng thôn Thượng Hải (xã Bình Lãng), khu triều thôn Quảng Giang (xã Đại Hợp), khu triều thôn Mỹ Ân (xã Văn Tố)... Tại các ruộng bị nhiễm bệnh, tỷ lệ bệnh trung bình 8-10% số lá, cao 20- 30% số lá.

- Một số ít diện tích lúa thuộc trà muộn phải gieo cấy lại do ảnh hưởng của rét đang trong giai đoạn đòng đều đến đòng già, thấp tho trở nằm rải rác trên các khu đồng của các xã. Trên những diện tích này phát hiện thấy trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 đã vũ hóa, với mật độ trung bình 1- 2 con/ m^2 , trong đó cá biệt những ruộng lúa xanh non, gần đèn, đường giao thông, ven làng có mật độ 3- 4 con/ m^2 , có ruộng 10- 12 con/ m^2 .

- Rầy nâu, rầy lưng trắng đã phát sinh trên các giống lúa nhiễm như các giống nếp, Bắc thơm số 7, P6 và trên những diện tích lúa cấy dày, chân ruộng trũng.

- Một số loại sâu bệnh khác cũng đã xuất hiện rải rác trên các diện tích lúa như: Sâu đục thân hai chấm, đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt...

Trước tình hình trên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn đôn đốc, chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp, Khuyến nông viên cơ sở, Đài truyền thanh phối hợp với Hội Nông dân xã tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân tranh thủ những thời điểm tạnh ráo, tích cực kiểm tra đồng ruộng và thực hiện tốt việc phòng trừ một số loại sâu bệnh sau đây:

1. Đối với diện tích lúa trà sớm đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch

Khi kiểm tra, nếu phát hiện có rầy nâu- rầy lưng trắng, bệnh bạc lá với mật độ và tỷ lệ bệnh cao, nông dân nên tiến hành thu hoạch sớm theo phương châm “*xanh nhà hơn già đồng*” để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, do thời tiết bất lợi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và hạn chế ô nhiễm môi trường.

2. Đối với diện tích lúa trà muộn đang giai đoạn chín sữa- chắc xanh

Khuyến cáo các hộ nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại cần tiến hành phun phòng trừ kịp thời. Cụ thể như sau:

2.1. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:

Chủ động kiểm tra, phát hiện bệnh sớm và phun phòng sau các đợt mưa giông trên các giống nhiễm như: P6, BC15, Bắc Thom, giống có bản lá to, ruộng chăm bón thừa đạm. Sử dụng các loại thuốc như: *Staner 20WP*, *Physan 20SL*, *Total 200WP*, *Team gold 101WP*... Nồng độ pha thuốc theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít/ sào.

2.2. Rầy nâu - Rầy lưng trắng:

Nếu phát hiện mật độ rầy từ 30 - 40 con/khóm ($1.500 - 2.000 \text{ con/m}^2$) trở lên cần tiến hành phun trừ ngay bằng các loại thuốc như: *Oshin 20WP*, *Chess 50WG*, *Super Check 720WP*...

Nếu mật độ rầy cao, nên phối kết hợp hai dòng thuốc tiếp xúc, xông hơi + lưu dẫn nội hấp như: *Oshin 20WP* + *Bassa 50EC*,... để đạt hiệu quả cao hơn.

Lưu ý: Khi cây lúa chuyển qua giai đoạn chín, khả năng lưu dẫn kém, cần phải rẽ lúa thành hàng, phun kỹ và trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú tập trung gây hại.

3. Đối với các diện tích lúa trà muộn trở vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2022

3.1. Sâu cuốn lá nhỏ lúa 3:

- Nông dân cần lưu ý kiểm tra lúa trà muộn đang trong giai đoạn đồng đều, khi phát hiện có trường thành sâu cuốn lá nhỏ tập trung với mật độ cao cần phun trừ sau khi phát hiện bướm vũ hóa rộ 5-7 ngày.

- Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 3 từ ngày 30/5 - 02/6.

- Khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng một trong các loại thuốc như: Thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate (như *Dylan 5WG*, *Brocom 50WG*, *Emaben 3.6WG*...), Flubendiamide (*Takumi 20WG*...), Indoxacarb (*Sunset 300WG*...) Liều lượng phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, phun thuốc vào chiều mát, phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít /sào.

3.2. Các đối tượng sâu bệnh hại khác:

Ngoài các đối tượng trên, nông dân cần chủ động kiểm tra và phun trừ nếu xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, đen lép hạt và sâu đục thân hai chấu theo công văn hướng dẫn số 08/DVNN- BVTV ngày 28/4/2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Lưu ý: Trong thời gian tới thời tiết trên địa bàn huyện thường xuyên có mưa, vì vậy để phát huy hết tác dụng của thuốc trước khi phun trừ nông dân cần theo dõi diễn biến của thời tiết, đảm bảo lá lúa không bị đọng nước, nếu sau khi phun trừ khoảng 2-3 giờ mà bị mưa cần phải phun trừ lại.

Nhận được công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
 - BTV Huyện ủy;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - BCĐ SXNN huyện;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Như kính gửi;
 - Lưu TT.
- } Đề báo cáo

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Thắng