

Số: /TT DV NN- KN

Tứ Kỳ, ngày 16 tháng 6 năm 2023

V/v Hướng dẫn các biện pháp phòng
trừ dịch hại lúa mùa đầu vụ năm 2023

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các xã, thị trấn;
 - Giám đốc HTX DV nông nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2023 số 80/KH-UBND ngày 21/04/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ; để phòng được dịch hại ngay từ đầu vụ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn giao HTX dịch vụ nông nghiệp và Khuyến nông viên cơ sở phối hợp với Hội Nông dân xã, Đài Truyền thanh khuyến cáo tăng cường công tác hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật tại thời điểm đầu vụ Mùa năm 2023 như sau:

1. Trừ rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và vàng lá di động

Tập trung phun trừ rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen đối với toàn bộ diện tích mạ được để hạn chế môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lụi. Thời điểm phun trước nhổ cấy từ 7 - 10 ngày.

Sử dụng một trong các loại thuốc như: *Oppo 50WG*, *Oshin 20WP*, *Chess 50WG*,... Nồng độ theo hướng dẫn ghi trên bao bì của nhà sản xuất, phun đảm bảo 1 bình 16 lít/sào mạ, nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát.

2. Các biện pháp trừ cỏ trên lúa

2.1. Biện pháp thủ công và canh tác

Vệ sinh đồng ruộng, mương máng trước khi gieo cấy. Cây, bừa làm đất kỹ và trang ruộng bằng phẳng: Với mục đích vùi sâu cỏ và hạt cỏ vào trong đất, cỏ và hạt cỏ không tiếp xúc được với ánh sáng nên khó phát triển. Duy trì mực nước trong ruộng sẽ hạn chế cỏ dại.

2.2. Biện pháp hóa học

- Đối với lúa gieo thẳng:

Chỉ sử dụng nhóm thuốc cỏ tiền nảy mầm sớm có khả năng diệt cả cỏ một và hai lá mầm như: *Sofit 300EC*, *Panany 300EC*, *Chani 300EC*, *Vithafit 300EC*... Nhóm thuốc này sử dụng tốt nhất ngay sau khi gieo sạ từ 0-3 ngày (*lưu ý, khi sử dụng nhóm thuốc này giữ ẩm và không để nước đọng trên mặt ruộng*).

- Đối với lúa cấy mạ sân:

Nên sử dụng nhóm thuốc tiền nảy mầm dòng hoạt chất Butachlor như: *Heco 600EC*, *Taco 600EC*... nhóm này sử dụng sau khi đặt mạ từ 3-5 ngày, khi sử dụng ruộng phải có từ 3-5 cm nước và giữ nước trong ruộng từ 5-7 ngày, hoặc sử dụng

thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm như: *Vitarai 18.5WP*, *Sofit Gold 271 WP*... nhóm này có thể sử dụng rắc hoặc phun thuốc từ 5-21 ngày sau cấy. Khi sử dụng nhóm thuốc này mức nước trên ruộng chỉ được để 1-2 cm và luôn duy trì mức nước trên trong 5-7 ngày. (Chú ý: Tuyệt đối không sử dụng thuốc như: *Acenidax 17WP*, *Arorax 17WP*, *Aloha 25WP*, bởi dùng phun trừ cỏ cho ruộng cấy mạ sên sẽ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng & phát triển của lúa).

- Đối với mạ được:

Ngoài sử dụng nhóm thuốc trừ cỏ như lúa cấy mạ sên còn có thể sử dụng một số thuốc trừ cỏ khác như: *Ferim 18.5WP*, *Acenidax 17WP*, *Arorax 17WP*, *Aloha 25WP*... Phun hoặc trộn với đất bột mịn để rắc sau cấy từ 7 -10 ngày, khi rắc hoặc phun ruộng phải có 2-3 cm và tuyệt đối không để nước ngập nổi cây lúa.

*Chú ý: Khi sử dụng thuốc trừ cỏ phải tùy thuộc vào đặc tính của thuốc mà điều chỉnh mực nước trên ruộng cho phù hợp để phát huy hết khả năng diệt cỏ của thuốc. Phải phun hoặc rắc đều trên ruộng, tốt nhất là phun thuốc. Không phun lại thuốc trừ cỏ trên diện tích đã xử lý thuốc.

3. Các biện pháp diệt trừ ốc bươu vàng

3.1. Biện pháp thủ công

Tạo các rãnh nhỏ xung quanh ruộng, khi tháo nước ốc tập trung ở rãnh rồi thu gom. Cắm cọc rải rác quanh ruộng để ốc dễ trúng lên, sau đó thu gom trứng. Tại các nơi dẫn nước vào ruộng nên đặt lưới để ngăn chặn ốc xâm nhập.

3.2. Biện pháp hóa học

Cần kiểm tra và sử dụng thuốc trừ OBV cho những diện tích lúa non như; đặt mạ sên, gieo vãi khi phát hiện thấy ốc gây hại. Không phun thuốc tràn lan gây lãng phí vật tư và làm ô nhiễm môi trường. Đối với OBV sử dụng thuốc phun như: *Snail Tagold 750 WP*, *Robert 888WP*, *Clodan supe 700 WP* ... Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. (Chú ý: Khi sử dụng thuốc trừ OBV tùy vào mực nước trên ruộng mà điều chỉnh nồng độ thuốc cho phù hợp để phát huy tác dụng diệt ốc của thuốc).

4. Công tác diệt chuột phá hại

Đề nghị các địa phương phát động và triển khai chiến dịch “Tuần lễ diệt chuột” đồng loạt trên toàn huyện. Đặc biệt trong thời điểm đồ ải tăng cường đánh bắt chuột, cần lưu ý cả tiến hành diệt chuột ở cả các khu vực chuyển đổi, khu dân cư, các khu đồng tiếp giáp với tuyến đường gom của đường cao tốc.

Trên đây là một số biện pháp phòng trừ dịch hại đầu vụ mùa 2023, đề nghị ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
 - BTV Huyện uỷ;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - BCĐ SXNN huyện;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Như kính gửi;
 - Lưu TT.
- } Để báo cáo



Nguyễn Minh Thắng