

Số: 13/TT DV NN- BVTV

V/v tăng cường chăm sóc, phòng trừ
bệnh đạo ôn lá trên lúa vụ Chiêm Xuân 2023

Tứ Kỳ, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Chủ tịch Hội nông dân, GD HTX DV nông nghiệp.

Hiện nay, lúa Chiêm Xuân trà sớm (*chiếm 8% diện tích*) đang trong giai đoạn phân hóa lông đót- đứng cái, trà muộn (*chiếm 92% diện tích*) đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ. Thời tiết những ngày qua, trời nhiều mây, nhiệt độ trung bình 24°C - 28°C , có mưa nhỏ, ẩm độ cao. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới trời hửng nắng, tiếp tục có mưa nhỏ về đêm và sáng sớm, thuận lợi cho lúa Chiêm Xuân sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn lá.

Qua kiểm tra, bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện và gây hại trên các diện tích cây giống nhiễm như Nếp, TBR- 225, Đài Thơm 8, Q5..., diện tích lúa chăm bón mất cân đối, bón thừa đạm. Tỷ lệ bệnh trung bình 5- 10 % số lá, cao 10- 30% số lá, cá biệt 50- 70% số lá.

Để lúa Chiêm Xuân sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ dân thực hiện một số công việc cần thiết sau:

1. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa Chiêm Xuân:

1.1. Bón phân đón đòng:

Tiến hành bón thúc đón đòng ngay khi cây lúa tròn khóm, hoặc khi thấy lá lúa có hiện tượng thắt eo trên chóp lá bằng phân kali (KCl) với lượng từ 2- 3 kg/sào hoặc phân NPK có hàm lượng kali cao, liều lượng bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

* Lưu ý: - Không được bón đạm Ure cho lúa ở giai đoạn này, nhất là trên các giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn như: các giống Nếp, TBR- 225, Đài Thơm 8...và những diện tích chăm bón mất cân đối giai đoạn đầu vụ. Chỉ nên bón đạm Ure cho những diện tích lúa còn chậm phát triển, còi cọc...Lượng bón không quá 1kg/sào.

- Những địa phương có diện tích lúa bị nhiễm mặn phải gieo cấy hoặc dặm lại trong thời gian vừa qua, cần lưu ý:

+ Đối với những diện tích lúa đã hồi phục và sinh trưởng bình thường thì tiến hành chăm bón như trên.

+ Đối với những diện tích lúa vẫn còn phát triển chậm thì căn cứ theo lượng phân đã sử dụng để bố trí lượng phân bón giai đoạn này cho phù hợp, tránh lạm dụng phân Ure, có thể dùng NPK có hàm lượng K cao, phân bón lá... để lúa phát triển, nhanh bước vào thời kỳ đứng cái- làm đòng.

1.2. Điều tiết nước trong ruộng lúa:

- Kết thúc đẻ nhánh cần tháo nước phơi ruộng khoảng 5- 7 ngày để rễ ăn sâu, tăng khả năng chống đổ ngã, hạn chế đẻ nhánh vô hiệu.

- Giai đoạn lúa đứng cái làm đồng: cần giữ mực nước trong ruộng từ 3- 5 cm để thuận lợi cho lúa sinh trưởng và phát triển.

**Lưu ý:* Không phun phân bón lá, bón phân chứa đạm hoặc sử dụng chất kích thích sinh trưởng khi lúa đang bị bệnh đạo ôn lá, chỉ sử dụng khi bệnh đã dừng hoàn toàn (lá non phát triển và không có vết bệnh).

2. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời bệnh đạo ôn lá cho lúa Chiêm Xuân:

2.1. Triệu chứng bệnh đạo ôn lá:

Trên lá ban đầu là những chấm nhỏ màu nâu đỏ hoặc mờ vết dầu, sau đó chuyển sang màu xám nhạt. Vết bệnh lớn dần và có hình thoi ở giữa có màu trắng xám. Khi bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết với nhau làm cho toàn lá bị cháy lụi.

2.2. Các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn lá:

- Các địa phương cần tích cực tuyên truyền các hộ nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra phát hiện bệnh đạo ôn lá sớm, để có biện pháp phun trị bệnh kịp thời, nhất là trên các giống nhiễm: Các giống Nếp, Đài Thơm 8, TBR 225..., trên các ruộng chăm bón mất cân đối, thừa đạm (biểu hiện lá to bản, màu xanh đen, mềm yếu).

- Khi phát hiện lúa bị nhiễm bệnh cần phải xử lý ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu như: *Filia 525SE, Map flash 75WP, Bankan 600WP, Fujone 40EC, Tigon Diamond 800WP*...Liều lượng, kỹ thuật sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì. Phun đảm bảo 01 bình 16-18 lít/sào, phun thuốc khi lá lúa đã khô sương. Đối với những ruộng bị hại nặng cần phun nhắc lại sau 5- 7 ngày.

- Cần duy trì mực nước ruộng phù hợp để tăng hiệu quả khi sử dụng thuốc, tránh để ruộng khô hạn khi có bệnh xảy ra.

**Lưu ý:* Không nên kết hợp nhiều loại thuốc BVTV để phun, chỉ phối hợp các loại thuốc khi có khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Nhận được công văn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân, Hội Nông dân các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan cùng quan tâm, phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo các hộ nông dân thực hiện tốt nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
- BTV Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ SXNN huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- Các đại lý kinh doanh thuốc BVTV;
- Như kính gửi;
- Lưu TT.

} Để báo cáo

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Thắng