

Số: 19/HD - TT DV NN

Về việc tăng cường phòng sâu bệnh
trên lúa Chiêm xuân cuối vụ năm 2023

Tứ Kỳ, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Giám đốc Hợp tác xã DV nông nghiệp.

Hiện nay, lúa Chiêm xuân trên địa bàn huyện trà sớm đang trong giai đoạn chắc xanh đến đỏ đuôi, trà muộn đang trong giai đoạn chín sữa đến chắc xanh. Trung tâm DV Nông nghiệp huyện qua kiểm tra thực tế đồng ruộng đã phát hiện tại các xã Quang Phục, Chí Minh, Đại Hợp, Dân Chủ, Bình Lăng, Minh Đức, An Thanh, Văn Tố, Cộng Lạc... đã xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng đang trong giai đoạn từ tuổi 2 đến tuổi 5, với mật độ trung bình từ 400- 600 con/m², cao 1000- 2000 con/ m², cá biệt có ổ 6000- 8000 con/m², tập trung gây hại trên các giống nhiễm như: Bắc thơm, Nếp, Đài thơm..., trên chân ruộng gieo cấy dày không hợp lý, thường xuyên đọng nước, chăm bón mất cân đối (thừa đạm). Bên cạnh đó, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, đen lép hạt, đạo ôn cổ bông... gây hại rải rác trên những giống nhiễm, ruộng chăm bón dư thừa đạm, xanh non.

Trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trung bình 30⁰C- 33⁰C, ẩm độ không khí cao 50- 75%, thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng nếu không được phát hiện và phun trừ kịp thời. Trước tình hình trên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp đôn đốc, chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt việc phòng trừ một số loại sâu bệnh sau:

1. Rầy nâu - Rầy lưng trắng:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt lưu ý các giống nhiễm, ruộng trũng thường xuyên đọng nước, chăm bón mất cân đối, ruộng cấy chân mạ... Khi phát hiện mật độ rầy từ 40 con/khóm (1.500- 2.000 con/m²) trở lên cần tiến hành phun trừ ngay, sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: **Dinotefuran (Oshin 20WP)**, **Pymetrozine + Nitenpyram (Chess 50WG)**, nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

- Khi cây lúa đang chắc hạt hoặc chuyển qua giai đoạn chín, khả năng lưu dẫn kém, khi phun cần phải rẽ lúa thành hàng, phun kỹ và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại. Có thể kết hợp dùng lân hữu cơ (thuốc xông hơi) với các loại thuốc kể trên.

- Thực hiện pha thuốc đúng nồng độ khuyến cáo, phun đủ lượng nước thuốc, khi phun hạ thấp vòi phun và nên duy trì nước ở trong ruộng để tăng hiệu quả phòng trừ. Phun thuốc vào buổi chiều mát. Cần đảm bảo thời gian cách ly sau phun thuốc.

* *Lưu ý:* Đối với những diện tích có mật độ rầy cao nhưng lúa đã chín thì nên thu hoạch sớm, không nên phun thuốc để hạn chế ô nhiễm môi trường, tránh lãng phí, tốn kém, sản phẩm thóc gạo không bị tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn:


Bệnh đang phát sinh và gây hại trên các giống nhiễm như: TBR225, Bắc Thom, giống có bản lá to, ruộng chăm bón mất cân đối... Để hạn chế bệnh, nông dân nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng sớm khi bệnh chớm xuất hiện bằng các loại thuốc như: **Physan 20SL, Total 200WP, Starner 20WP...** Nồng độ theo hướng dẫn ghi trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16- 18 lít/ sào.

Vậy, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan phối hợp đôn đốc, chỉ đạo các HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
 - BTV Huyện uỷ;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - BCĐ SXNN huyện;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Các đại lý kinh doanh thuốc BVTV;
 - Như kính gửi;
 - Lưu TT.
- } Đề báo cáo

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Thắng