

Số: 17/TTDVNN- BVTV

V/v tăng cường chỉ đạo phòng trừ
sâu bệnh hại lúa Chiêm Xuân 2023

Tứ Kỳ, ngày 27 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các HTX DV nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Hiện nay, lúa Chiêm xuân trà sớm đang trong giai đoạn đồng già, thấp tho trở đến trở thoát. Trà lúa muộn đang giai đoạn đồng đều đến đồng già, thấp tho trở. Một số ít diện tích trà muộn phải gieo cấy lại đang trong giai đoạn đồng non đến đồng đều. Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phát hiện sâu cuốn lá nhỏ và sâu non (*lúa 2*) sẽ nở rộ từ ngày 05- 09/5/2023, có thể gây hại trên phạm vi rộng và làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, thời tiết tại Hải Dương có khả năng xảy ra mưa dông, kèm theo tố lốc, nhiệt độ trung bình 24⁰C- 30⁰C. Do vậy, trong thời điểm tới, bệnh đạo ôn bông, đạo ôn lá sẽ có nguy cơ gây hại trên các diện tích chăm bón mất cân đối, diện tích gieo cấy các giống lúa nhiễm như: Nếp, Đài thơm 8, TBR 225, Q5...

Căn cứ công văn số 170/TBBVTV- NV ngày 21/4/2023 về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa Chiêm Xuân của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Dương, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn có liên quan, thành viên Tổ công tác tăng cường của huyện quan tâm phối hợp thực hiện tốt các công việc sau:

1. Các thành viên Tổ công tác tăng cường của huyện căn cứ nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách thường xuyên kiểm tra, theo dõi sát tình hình sâu bệnh phát sinh trên lúa Chiêm Xuân, báo cáo kịp thời với Trưởng BCD sản xuất nông nghiệp huyện để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc HTX DV nông nghiệp phối hợp với Hội Nông dân, Khuyến nông viên cơ sở, Đài truyền thanh xã tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông dân:

- Thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra đồng ruộng để chủ động phát hiện và kịp thời tiến hành các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn...Việc phun thuốc BVTV phải đảm bảo nguyên tắc 4 đúng "*đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng kỹ thuật*". Tránh lạm dụng thuốc BVTV, phun thuốc tràn lan, không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, tăng chi phí sản xuất và nhân lực không hợp lý. Các đối tượng sâu bệnh cần lưu ý trong thời gian tới cụ thể như sau:

2. 1. Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2:

- Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 từ ngày **05/5- 09/5** trên diện tích trà muộn.

- Đối với diện tích phải gieo cấy lại và cấy muộn sẽ phun trừ từ ngày **10/5- 13/5**
Khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng các loại thuốc như: thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate (*Brocom 50WG, Emaben 3.6WG...*), Flubendiamide (*Takumi 20WG...*), Indoxacarb (*Bite 30SC, Sunset 300WG...*).

Liều lượng phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, phun thuốc vào chiều mát, phun đảm bảo 01 bình 16- 18 lít /sào.

** Lưu ý: Tại những ruộng có mật độ bướm trưởng thành đông cao, hoặc sâu non đã tuổi lớn nên kết hợp thuốc có nguồn gốc thảo mộc Emamectin benzoate (Brocom 50WG...) + thuốc có hoạt chất Indoxacard (Bite 30SC, Sunset 300WG) sẽ cho hiệu quả phòng trừ cao.*

2. 2. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt trên các diện tích đã bị nhiễm đạo ôn lá, phun trừ khi bệnh chớm xuất hiện. Nên phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông vào thời điểm lúa đông già, bắt đầu trổ trên các diện tích cấy giống nhiễm hoặc đã bị nhiễm đạo ôn lá (*chú ý các diện tích cấy giống TBR 225, nếp...*).

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau để trừ bệnh đạo ôn lá cũng như phòng bệnh đạo ôn cổ bông như: *Fuan 40EC, Folia 525SE, Fufone 40EC, Flash75WP...* Liều lượng, kỹ thuật sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì. Phun đảm bảo 01 bình 16- 18 lít/sào, tránh thời điểm lúa phơi màu, phun nhắc lại lần 2 cho ruộng bị bệnh sau lần 1 từ 5- 7 ngày.

2. 3. Bệnh khô vằn, đen lép hạt:

Do điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, nắng mưa xen kẽ trong thời gian tới nên bệnh khô vằn, đen lép hạt sẽ có chiều hướng phát sinh mạnh và lây lan theo diện rộng. Để hạn chế bệnh nên phun khi bệnh chớm xuất hiện. Sử dụng các loại thuốc như: *TD Vil 50SC, Hanovil 10SC, Nevo 330EC, Tilt super 300EC...* Nồng độ thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16- 18 lít/sào. Có thể phối hợp với các loại thuốc phun phòng trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông.

2. 4. Sâu đục thân hai chấm:

Trên các diện tích lúa thuộc trà sớm đang trong giai đoạn đông già - thấp thỏ trổ đây là thời điểm phun trừ đối tượng sâu đục thân hai chấm cho hiệu quả cao nhất. Chú ý những nơi có mật độ ổ trứng cao 0,2- 0,5 ổ/m². Khi phun trừ sử dụng một số các loại thuốc như: *Virtako 40WG, Dupont prevathon 5SC,...* Nồng độ, liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16- 18 lít/sào.


2. 5. Diệt trừ chuột phá hại:

Chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả trên đồng ruộng, tại các khu gò, đồng, ruộng để hoang không canh tác, khu chuyển đổi, khu bãi rác, nghĩa địa, khu dân cư, ven tuyến đường gom... Không bẫy chuột bằng điện dưới mọi hình thức.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn có liên quan, thành viên Tổ công tác tăng cường của huyện quan tâm phối hợp chỉ đạo các HTX nông nghiệp, các hộ nông dân thực hiện tốt các công việc trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ SXNN huyện;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Thắng