

Số: /DV NN- BVTV

Về việc phòng trừ sâu bệnh trên lúa
vụ Chiêm xuân 2022 trong thời điểm hiện nay

Tứ Kỳ, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Giám đốc HTX DV nông nghiệp xã, thị trấn, các đại lý thuốc BVTV.

Thời tiết trong những ngày qua trời nắng nhiệt độ trung bình từ 28°C - 30°C . Theo dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết trong những ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào trên diện rộng, nhiệt độ trung bình ngày đêm 28°C - 22°C , ẩm độ 70 - 95%. Với điều kiện ẩm độ và nhiệt độ nêu trên rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Qua kiểm tra thực tế diện tích lúa Chiêm xuân trên địa bàn huyện cho thấy:

- Trà sớm đang trong giai đoạn đồng già - thấp tho trở, trà muộn đang trong giai đoạn đứng cái - đồng non, đồng đều.

- Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đã vũ hóa, tại những ruộng phát hiện thấy trưởng thành mật độ trung bình 0,5 - 1,0 con/m²; những diện tích lúa xanh non, diện tích lúa gần đền, đường giao thông, ven làng có mật độ 2 - 3 con/m².

- Bệnh đạo ôn lá đã gây hại trên các giống nhiễm (BC15, TBR 225, các giống nếp, Q5...), trên những diện tích lúa cây dày, chăm bón mất cân đối (dư thừa đạm) với tỷ lệ bệnh trung bình 5 - 10% số lá, cao 20 - 30% số lá.

- Bệnh khô vằn phát sinh gây hại trên các diện tích lúa cây dày, chăm bón mất cân đối với tỷ lệ bệnh trung bình 3 - 5% số đánh, cao 10 - 20% số đánh.

- Sâu đục thân hai chấm xuất hiện rải rác với mật độ thấp trên tất cả các trà lúa.

Trước tình hình trên, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn đôn đốc, chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp, Khuyến nông viên cơ sở, Đài truyền thanh phối hợp với Hội Nông dân xã tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng và thực hiện tốt việc phòng trừ một số loại sâu bệnh sau đây:

1. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2:

- Nông dân cần lưu ý kiểm tra lúa trà muộn, trà sớm xanh non, khi phát hiện có trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ với mật độ 1-2 con/m² trở lên cần tập trung phun trừ sau khi phát hiện bướm vũ hóa rõ 5-7 ngày.

Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 từ ngày 03/5 - 06/5 (đây là khoảng thời gian thời tiết không có mưa thuận lợi cho việc phun trừ)

- Khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng một trong các loại thuốc như: Thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate (như Dylan 5WG, Brocom 50WG, Emaben 3.6WG...), Flubendiamide (Takumi 20WG...), Indoxacarb (Sunset 300WG...) Liều lượng phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, phun thuốc vào chiều mát, phun đảm bảo 01 bình 16 - 18lít /sào.

Nếu sau khi phun trừ khoảng 2-3 giờ mà bị mưa cần phải phun trừ lại.

* Lưu ý: Tại những ruộng có mật độ trưởng thành dòn cao, hoặc sâu non đã tuổi lớn nên kết hợp thuốc có nguồn gốc thảo mộc Emamectin benzoate (Dylan 5WG, Brocom 50WG...) + thuốc có hoạt chất Indoaxard (Sunset 300WG) sẽ cho hiệu quả phòng trừ cao.

2. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện lúa đã chớm bị nhiễm đạo ôn lá, cần phun trừ ngay.

Đối với trà sớm, nên phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông vào thời điểm lúa đồng già, bắt đầu trổ trên các diện tích cấy giống nhiễm hoặc đã bị nhiễm đạo ôn lá.

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau để trừ bệnh đạo ôn lá cũng như phòng bệnh đạo ôn cổ bông như: Fuan 40EC, Folia 525SE, Fendy 25WP, Fujone 40EC... Liều lượng, kỹ thuật sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì. Phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít/sào, phun thuốc vào chiều mát để tránh thời điểm lúa phơi màu, phun nhắc lại lần 2 cho ruộng bị bệnh sau lần 1 từ 5-7 ngày.

3. Bệnh khô vằn, đen lép hạt:

Do điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, nắng mưa xen kẽ trong thời gian tới nên bệnh khô vằn sẽ có chiều hướng phát sinh mạnh và lây lan theo diện rộng trên tất cả các trà lúa. Bệnh đen lép hạt sẽ gây hại trên diện tích lúa trà sớm.

Để hạn chế bệnh khô vằn và bệnh đen lép hạt, nên phun khi bệnh chớm xuất hiện. Sử dụng các loại thuốc như: Hanovil 10SC, Nevo 330EC, Tilt super 300ND... Nồng độ thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16 -18 lít/sào. Có thể phối hợp với các loại thuốc phun phòng trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông.

4. Sâu đục thân hai chấm:

Trên các diện tích lúa thuộc trà sớm đang trong giai đoạn đồng già - thấp tho trổ đây là thời điểm cần lưu ý đối tượng sâu đục thân hai chấm. Khuyến cáo nông dân phun trừ sâu đục thân khi phát hiện bướm vũ hóa rộ sau 07 ngày. Chú ý những nơi có mật độ trứng cao ($0,2 - 0,5 \text{ ổ}/\text{m}^2$ tương đương bình quân khoảng 30- 70 quả/ m^2). Khi phun trừ sử dụng một số các loại thuốc như: Virtako 40WG, Dupont prevathon 5SC...Nồng độ, liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16 -18 lít/sào.


5. Diệt trừ chuột phá hại:

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc HTX dịch vụ nông nghiệp, các tổ đội diệt chuột, các hộ nông dân đồng loạt tổ chức đánh bắt chuột bằng biện pháp thủ công: soi đèn đập chuột ban đêm, đặt bẫy, mồi bả...Tiến hành bắt chuột cả khu dân cư, khu gò đồng, khu chuyển đổi, khu ven đường cao tốc. Tuyệt đối không bẫy chuột bằng điện dưới mọi hình thức.

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan, UBND các xã, thị trấn đôn đốc, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
 - BTV Huyện uỷ;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - BCĐ SXNN huyện;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Như kính gửi;
 - Lưu TT.
- } Để báo cáo



Nguyễn Minh Thắng