

UBND HUYỆN TỨ KỲ
TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/TT DV NN- BVTV

Về việc tăng cường kiểm tra phát hiện, phun trừ rầy
nâu đối với lúa trà trung chính vụ và phòng trừ bạc lá
cho diện tích trà trung cây muộn (cấy sau 15/7)
vụ Mùa 2023

Tứ Kỳ, ngày 27 tháng 09 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Giám đốc Hợp tác xã DV nông nghiệp.

Hiện nay, trên địa bàn huyện lúa Mùa trà sớm đang giai đoạn chín chờ thu hoạch, trà trung chính vụ đang giai đoạn đỏ đuôi đến chín, trà trung muộn đang giai đoạn chắc xanh đến đỏ đuôi. Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng cho thấy:

- Trên các diện tích lúa thuộc trà sớm, trà trung gieo cấy đầu lịch đang giai đoạn đỏ đuôi- chín đã phát hiện một số diện tích lúa như ở các xã Chí Minh (*đồng thôn Nam An*), Hà Kỳ (*đồng thôn Đại Hà*) bắt đầu phát sinh rầy nâu (*rầy cám*) với mật độ trung bình từ 500 - 800 con/m², nơi cao từ 1.500- 3.000 con/m², cá biệt từ 5.000- 8.000 con/m² và gây cháy cục bộ.

- Trên lúa trà trung chính vụ bắt đầu xuất hiện rầy nâu đang giai đoạn trưởng thành đến trứng, tập trung trên các giống nhiễm như: P6, Bắc thơm, Nếp, Đài thơm..., ruộng thường xuyên đọng nước, chăm bón mất cân đối.

- Ngoài ra còn phát hiện bệnh bạc lá gây hại trên những trà trung cây muộn (sau 15/7), trên giống nhiễm, ruộng xanh non, chăm bón mất cân đối, dư thừa đạm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết từ 28/9 - 05/10 dự báo trời vẫn thường xuyên có mưa và mưa giông rải rác, nhiệt độ từ 25⁰C - 32⁰C. Với điều kiện thời tiết như vậy, dự báo rầy nâu tiếp tục phát sinh gây hại và có nguy cơ gây cháy trên diện rộng nếu không được phát hiện và phun trừ kịp thời. Bệnh bạc lá vẫn tiếp tục phát sinh và gây hại trên các giống nhiễm (*Bắc thơm số 7, TBR 225, BC 15, Đài Thơm...*), đặc biệt sau các đợt mưa giông.

Để phòng trừ kịp thời, hiệu quả sâu bệnh đối với lúa Mùa 2023 trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các HTX DV nông nghiệp phối hợp với Đài Truyền thanh, Hội Nông dân tích cực hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tập trung chống úng ngập cục bộ và thu hoạch trên các diện tích lúa đã chín:

- UBND xã, thị trấn chỉ đạo HTX DV Nông nghiệp tăng cường kiểm tra, bơm gạn đối với những diện tích lúa khu triều trũng bị úng ngập úng sau những đợt mưa to trong thời gian vừa qua.

- Khuyến cáo các hộ nông dân có diện tích lúa đã chín cần khẩn trương, tập trung thu hoạch sớm để tránh mọi rủi ro trên đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trồng các loại cây vụ Đông.

2. Tích cực, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và phun trừ hiệu quả rầy nâu đối với lúa mùa trà trung:

Nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt trên các giống nhiễm như; P6, nếp, TBR 225, Bắc thơm 7, ruộng trũng thường xuyên đọng nước, chăm bón mất cân đối, ruộng cây chân mạ...

- *Đối diện tích đang giai đoạn chắc xanh (thuộc trà trung):* Chỉ phun thuốc khi phát hiện mật độ rầy từ 40 con/khóm ($1.500 - 2.000 \text{ con/m}^2$) trở lên. Khi tiến hành phun trừ sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: **Dinotefuran (Oshin 20WP)**, **Pymetrozine + Nitenpyram (Chess 50WG)**, **Oppo 50WG**, nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

- *Đối với diện tích lúa đang giai đoạn đổ đúi:* Khả năng lưu dẫn kém, khi phun cần phải rẽ lúa thành hàng, phun kỹ và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại. Có thể kết hợp dùng lân hữu cơ (*thuốc xông hơi*) với các loại thuốc lưu dẫn nói trên.

- Thực hiện pha thuốc đúng nồng độ khuyến cáo, phun đủ lượng nước thuốc, khi phun hạ thấp vòi phun và nên duy trì nước ở trong ruộng để tăng hiệu quả phòng trừ. Lưu ý nên phun thuốc vào buổi chiều mát. Nếu gặp mưa sau khi phun 1h cần phải phun lại. Cần đảm bảo khoảng cách thời gian an toàn sau phun thuốc.

3. Kiểm tra và phun trừ bệnh bạc lá đối với những diện tích lúa Mùa trà trung cây muện (cấy sau 15/7):

- Một số diện tích trà trung cây muện tập trung ở các khu triều trũng của xã Quang Trung, Tiên Động, An Thanh, Văn Tổ, Nguyên Giáp... Bệnh đang phát sinh và gây hại trên các giống nhiễm như: P6, Bắc Thơm, giống có bản lá mềm to, ruộng chăm bón mất cân đối.

- Để hạn chế bệnh, khuyến cáo các hộ nông dân nên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng sớm khi bệnh chớm xuất hiện hoặc sau các đợt mưa giông bằng các loại thuốc như: **Physan 20SL**, **Total 200WP**, **Starner 20WP**... Nồng độ theo hướng dẫn ghi trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít/ sào.

Vậy Trung tâm dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan phối hợp đôn đốc, chỉ đạo các HTX DV Nông nghiệp hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Chi cục BVTV tỉnh;
 - BTV Huyện uỷ;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
 - BCĐ SXNN huyện;
 - Đài phát thanh huyện;
 - Các đại lý kinh doanh thuốc BVTV;
 - Như kính gửi;
 - Lưu TT.
- } Đề báo cáo



Nguyễn Minh Thắng